

LISTA 9

1) a) Fie $\varphi \in \mathbb{R}$. Să se arate că rotația în plan de unghi φ , adică funcția

$$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad h(x, y) = (x \cos \varphi - y \sin \varphi, x \sin \varphi + y \cos \varphi),$$

este automorfism al lui \mathbb{R}^2 . Să se scrie matricea lui h în baza canonica a lui \mathbb{R}^2 (adică în baza (e_1, e_2) , cu $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$).

b) Să se arate că funcțiile $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x, -y)$ (simetria în raport cu axa Ox) și $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (-x, y)$ (simetria în raport cu axa Oy) sunt automorfisme ale lui \mathbb{R}^2 . Să se scrie matricele lui f , g , $f - g$, $f + 2g$ și $g \circ f$ în baza canonica.

2) Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x + y, 2x - y, 3x + 2y)$. Să se arate că f este o transformare liniară, să se arate că $v = ((1, 2), (-2, 1))$, respectiv $v' = ((1, -1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 1))$ este bază în \mathbb{R}^2 , respectiv \mathbb{R}^3 și să se scrie matricea lui f în perechea de baze (v, v') .

3) Să se arate că fiecare dintre mulțimile de vectori $\{v_1, v_2, v_3\}$ și $\{v'_1, v'_2, v'_3\}$ cu

$$v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (2, 3, 3), v_3 = (3, 7, 1) \text{ și } v'_1 = (3, 1, 4), v'_2 = (5, 2, 1), v'_3 = (1, 1, -6)$$

formează câte o bază a lui \mathbb{R}^3 și să se găsească legătura dintre coordonatele unui vector scris în cele două baze.

4) Fie $v = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ o bază a \mathbb{R} -spațiului vectorial \mathbb{R}^4 , vectorii

$$u_1 = v_1, \quad u_2 = v_1 + v_2, \quad u_3 = v_1 + v_2 + v_3, \quad u_4 = v_1 + v_2 + v_3 + v_4$$

și $f \in End_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4)$ cu

$$[f]_v = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Să se arate că $u = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ este o bază a lui \mathbb{R}^4 și să se scrie matricea $[f]_u$.

5) Fie V un spațiu vectorial real, $v = (v_1, v_2, v_3)$ o bază a spațiului V , vectorii

$$u_1 = v_1 + 2v_2 + v_3, \quad u_2 = v_1 + v_2 + 2v_3, \quad u_3 = v_1 + v_2$$

și $f \in End_{\mathbb{R}}(V)$. Să se arate că $u = (u_1, u_2, u_3)$ este o bază a lui V și să se scrie matricea lui $[f]_v$ știind că

$$[f]_u = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{pmatrix}.$$

6) Fie $P_2(\mathbb{R}) = \{f \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } f \leq 2\}$. Să se arate că

$$\varphi : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}), \quad \varphi(a_0 + a_1 X + a_2 X^2) = a_0 + a_1 + (a_1 + a_2)X + (a_0 + a_2)X^2$$

este o transformare liniară și să se determine $[f]_b$ și $[f]_{b'}$ unde

$$b = (1, X, X^2) \text{ și } b' = (1, X - 1, X^2 + 1).$$

7) Fie V, V' două \mathbb{R} -spații vectoriale, $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ câte o bază în V , respectiv V' și $f : V \rightarrow V'$ o transformare liniară a cărei matrice în perechea de baze (a, b) este

$$[f]_{a,b} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Să se determine:

- i) $f(v)$ pentru orice $v \in V$;
 - ii) dimensiunea spațiilor vectoriale $\text{Im } f$ și $\text{Ker } f$;
 - iii) matricea $[f]_{a',b'}$, unde $a' = (a_1, a_1 + a_2, a_1 + a_2 + a_3)$ și $b' = (b_1, b_1 + b_2, b_1 + b_2 + b_3)$.
- 8) Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ aplicația liniară definită pe baza canonica astfel:

$$f(e_1) = (1, 2, 3, 4), f(e_2) = (4, 3, 2, 1), f(e_3) = (-2, 1, 4, 1).$$

Să se determine:

- i) $f(v)$ pentru orice $v \in \mathbb{R}^3$;
- ii) matricea lui f în bazele canonice;
- iii) câte o bază în $\text{Im } f$ și $\text{Ker } f$.

9) Fie $S = \{(t, 2t, 3t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ și $T = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$.

- i) Să se arate că S și T sunt subspații ale lui \mathbb{R}^3 și să se reprezinte geometric elementele lor.
- ii) Să se determine câte o bază în S și T .
- iii) Să se determine $S \cap T$ și $S + T$.

10) Fie V, V' \mathbb{R} -spații vectoriale, $v = (v_1, v_2, v_3)$ o bază în V , $v' = (v'_1, v'_2, v'_3)$ o bază în V' și $f : V \rightarrow V'$ transformarea liniară cu

$$[f]_{v,v'} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Să se determine:

- i) dimensiunea și câte o bază pentru $\text{Im } f$ și $\text{Ker } f$;
- ii) $[f]_{v,e'}$ în cazul în care $V' = \mathbb{R}^3$, $v'_1 = (1, 0, 0)$, $v'_2 = (0, 1, 1)$, $v'_3 = (0, 0, 1)$ și e' este baza canonica a lui \mathbb{R}^3 ;
- iii) $f(x)$ pentru $x = 2v_1 - v_2 + 3v_3$, în condițiile de la ii).